

MANEJO DEL DOLOR DENTAL

Para el dolor dental, los **AINE** (medicamentos antiinflamatorios no esteroideos) son la primera línea de terapia. Por lo general, recomendamos el **ibuprofeno** (también conocido como Advil o Motrin) para el dolor dental porque trata no solo el síntoma del dolor sino también una de las causas del dolor: la inflamación.

El **acetaminofeno** (también conocido como **Tylenol**) se puede usar en lugar de ibuprofeno o con ibuprofeno.

Se ha demostrado que el ibuprofeno y el Tylenol tomados juntos **funcionan mejor que los opioides** (también conocidos como narcóticos) para el dolor dental. Además, el ibuprofeno y el Tylenol causan muchos menos efectos secundarios que los opioides. Además, **los opioides están relacionados con la sobredosis de drogas y la muerte**, por lo que se desaconseja el uso de opioides en el tratamiento del dolor dental..

	Ibuprofeno (Motrin, Advil)	Acetaminofeno (Tylenol)
Cuanto puedo tomar?	La mayoría de las personas pueden tomar 600 mg de ibuprofeno cada 6 horas durante varios días para ayudar a controlar el dolor dental. Eso es 3 píldoras de venta libre regulares (cada píldora de venta libre generalmente es de 200 mg, asegúrese de revisar la etiqueta). No tome más de 3200 mg al día (24 horas).	La mayoría de las personas pueden tomar 500-1000 mg de acetaminofén cada 6 horas sin exceder los 4000 mg en un día (24 horas) . Tenga mucho cuidado de no tomar demasiado acetaminofén u otros medicamentos que contengan este medicamento, ya que una sobredosis puede provocar insuficiencia hepática y la muerte..
¿Es seguro para mí?	Algunas personas no deben tomar ibuprofeno. Si está embarazada, es alérgica a los AINE, está tomando medicamentos anticoagulantes, tiene problemas renales, ha tenido úlceras estomacales o sangrado gastrointestinal, tiene hipersensibilidad a la aspirina, o toma litio u otros medicamentos que pueden afectar la función renal, hable con su dentista, médico o farmacéutico antes de tomar ibuprofeno.	Algunas personas no deben tomar acetaminofén. Si tiene problemas hepáticos, es alérgico al acetaminofén, tiene alcoholismo o bebe más de 3 bebidas al día, o tiene problemas renales graves, hable con su dentista, médico o farmacéutico antes de tomar ibuprofeno.

MANEJO DEL DOLOR DENTAL



Puede tomar ibuprofeno y acetaminofeno juntos para obtener un alivio adicional. Es mejor tomar algo de cada uno que demasiado.

Recuerde que tratar la causa del dolor es muy importante. Si tiene una infección dental, debe tratarse adecuadamente. No confíe solo en analgésicos para enmascarar su dolor. Si tiene dolor después de un procedimiento dental reciente y no mejora después de 3 días, o si el dolor comienza a empeorar, o experimenta hinchazón, fiebre, dificultad para tragar o dificultad para respirar, llámenos de inmediato o busque atención médica. inmediatamente. Puede estar experimentando una complicación que requiere intervención médica.

Si tiene alguna pregunta, llámenos al (215) 525-3046.