

PROTESIS REMOVIBLES INMEDIATO

¡Felicitaciones por recibir su nueva dentadura (prótesis)! Hay varias cosas importantes a tener en cuenta con este prótesis; siga todas las instrucciones cuidadosamente.

DIA 1:

Se le colocará el prótesis en la boca inmediatamente después de la finalización de la cirugía dental (extracciones). **Mantenga su dentadura postiza en su lugar durante las primeras 24 horas después de la cirugía (incluso mientras duerme).** Su prótesis actúa como un vendaje para ayudar a controlar el sangrado y limitar la inflamación. Si hay dolor o sangrado excesivo, o si siente que no puede mantener el prótesis en su lugar por cualquier otro motivo, llámenos.

SEMANA 1:

Después de las primeras 24 horas, debe quitarse la dentadura con cuidado dos veces al día y enjuagarse la boca suavemente con agua salada; NO escupa; en su lugar, deje que el agua gotee fuera de su boca. Limpie el prótesis cepillándola suavemente con un cepillo de dentadura postiza y enjuagándola con agua. Vuelva a colocar la dentadura inmediatamente después de la limpieza porque puede producirse hinchazón y es posible que no pueda volver a insertar el prótesis si espera demasiado. Si le quedan dientes naturales, debe cepillarlos después de volver a insertar el prótesis.

El día cuatro (4) después de la cirugía, debe quitarse la dentadura antes de acostarse y guardarla en agua con una solución limpiadora para el prótesis. Cepille el prótesis y enjuáguela con agua antes de volver a llevársela a la boca cuando se despierte.

Es común que aparezcan puntos doloridos con las dentaduras inmediatos. Es posible que sienta que tiene náuseas, que de repente tiene mucha saliva o que no puede morder bien. A veces puede tener dolor de garganta, dificultad para tragar o hablar. Estos y otros problemas pueden superarse con una curación adecuada, con su dentista ajustando su dentadura postiza para que se adapte a su boca y cuando se acostumbre a usar su dentadura postiza. **Es muy importante que regrese para sus visitas de seguimiento postoperatorias.** La primera visita suele ser de 1 a 7 días después de la cirugía. Su dentista le dará más instrucciones en esa visita. Debe esperar regresar al consultorio varias veces para controlar la cicatrización y ajustar la dentadura.

FUMAR: NO fume **NADA** durante tres (3) días después de la cirugía.

PARA QUITAR EL PRÓTESIS:

PROTESIS REMOVIBLES INMEDIATO

Si su prótesis reemplaza todos los dientes de la mandíbula, coloque un dedo limpio debajo del borde exterior posterior del prótesis para ayudar a romper la succión que mantiene la dentadura postiza en su lugar. Si su prótesis es un prótesis parcial y tiene broches, suelte con cuidado los broches de metal. **NO** intente quitar el prótesis tirando de los dientes.

La dentadura puede sentirse muy ajustada y ser difícil de quitar; esto es normal y se debe a la inflamación que normalmente ocurre después de la cirugía oral. El prótesis puede sentirse suelta y desigual; esto también es normal y suele ocurrir porque la forma del hueso de la mandíbula después de las extracciones no se puede predecir con total precisión al hacer un prótesis inmediato.

DIETA:

Puede comer con su dentadura; puede sentirse incómodo y probablemente le llevará más tiempo del que está acostumbrado. Consuma alimentos blandos y fríos durante al menos 3 días. Evite los alimentos o bebidas calientes. Evite masticar durante las primeras 24 horas, ya que puede crear un movimiento de bombeo con el prótesis que puede sacar los coágulos de sangre y volver a sangrar. **NO** use una pajita.

AJUSTE DE PRÓTESIS INMEDIATO:

Las dentaduras inmediatas requieren que el dentista y el laboratorio dental intenten predecir cómo se verá su boca después de la extracción de los dientes; esto no se puede hacer con total precisión. Por lo tanto, la dentadura inmediato no se ajustará perfectamente. A medida que su boca sana después de las extracciones, el hueso que solía sujetar los dientes comenzará a encogerse, lo que hará que el prótesis se afloje con el tiempo. Esto puede tardar unos días o unos meses. Es probable que necesite un reborde para su prótesis (una nueva superficie interior) o una nuevo prótesis tradicional hecha después de que la boca sane para lograr el mejor aspecto y ajuste para sus dientes protésicos. **El seguro generalmente NO pagará tanto por un prótesis inmediato como por un prótesis tradicional, por lo que debe conocer los posibles compromisos financieros que requieren los prótesis inmediatos.**

Si tiene alguna pregunta o inquietud, llámenos al (215) 525-3046.